

КЛЕЩЕВОЙ ЭНЦЕФАЛИТ



Клещевой энцефалит – природно-очаговая вирусная инфекция, характеризующаяся лихорадкой, интоксикацией и поражением головного мозга и/или спинного мозга.

Удмуртская Республика относится к субъектам с высокой заболеваемостью клещевым энцефалитом.



РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР
ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ



ЗД^{СИ}РОВАЯ
УДМУРТИЯ



8 800 200 0 200
ТАКЗДОРОВО.РУ



Переносчик ви́руса клещевого энцефалита

- ✓ Клещ – это паукообразное с четырьмя парами ног.
- ✓ Иксодовый клещ передвигается быстро по одежде и коже снизу вверх.
- ✓ Для присасывания он выбирает места с самой нежной кожей (за ушами, на шее, в подмышечных и паховых областях).
- ✓ Слюна клеша содержит обезболивающие вещества, поэтому укус можно сразу не заметить.



РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР
ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ
УДМУРТОВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ



ЗД^СРОВАЯ
УДМУРТИЯ



8 800 200 0 200
TAKZDOROVO.RU



**Возбудитель инфекции –
это вирус семейства flavивирусов.**

Переносчик вириуса клещевого
энцефалита – иксодовый клещ.

Способы заражения клещевым энцефалитом:

- присасывание инфицированных клещей;
- употребление сырого молока инфицированных коз и коров;
- раздавливание инфицированного клеща, в том числе при снятии с животных незащищенными руками.

Активность клещей: теплое время года,
с апреля по октябрь, пик активности – май-июль.

Места обитания клеща: леса, поля, парки,
скверы, где много травы, густого подлеска,
подстилки из опавшей гниющей листвы.



РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР
ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ



ЗД^ОРОВАЯ
УДМУРТИЯ



8 800 200 0 200
TAKZDOROVO.RU



Что делать в случае укуса клеща?

Как можно быстрее обратитесь в медицинскую организацию для удаления клеща и получения экстренной профилактики от клещевого энцефалита (иммуноглобулин, который вводят не позднее 3-х дней после укуса).

**В случае, если нет возможности
обратиться к врачу,
удалите клеща самостоятельно:**

- 1 захватите клеща как можно ближе к хоботку пинцетом;
- 2 поверните тело клеща вокруг оси, затем извлеките;



РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР
ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ
УДМУРТОВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ



ЗД^{СИ}РОВАЯ
УДМУРТИЯ



8 800 200 0 200
ТАКЗДОРОВО.РУ



Что делать в случае укуса клеща?

- 3** тщательно вымойте руки с мылом;
- 4** обработайте кожу в месте присасывания клеща любым доступным антисептиком для кожи;
- 5** поместите клеща в стеклянный флакон, плотно закройте крышкой;
- 6** доставьте банку с клещом в лабораторию ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» для исследований на наличие инфекций.



РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР
ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ



ЗД^{СИ}РОВАЯ
УДМУРТИЯ



8 800 200 0 200
TAKZDOROVO.RU



Меры предосторожности при удалении клеща

Запрещается:

- сдавливать тело клеща, чтобы избежать попадания инфекции в рану;
- резко дергать клеща – он оборвется;
- использовать масло – это затруднит извлечение клеща.



РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР
ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ
УДМУРТОВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ



ЗД^{СИ}РОВАЯ
УДМУРТИЯ



8 800 200 0 200
TAKZDOROVO.RU



Профилактика клещевого энцефалита

Профилактика клещевого энцефалита проводится в двух направлениях: вакцинация (специфическая) и предупредительные меры (неспецифическая).

Плановая вакцинация от клещевого энцефалита – это специальная вакцина убитого вируса.

При введении вакцины в организме вырабатываются антитела – иммуноглобулины. Иммуноглобулины связывают вирус и не дают ему проникнуть в клетку.



РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР
ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ



ЗД^СРОВАЯ
УДМУРТИЯ



8 800 200 0 200
TAKZDOROVO.RU



Стандартная схема вакцинации от клещевого энцефалита (специфическая профилактика)

Вакцинация проводится в 3 этапа.

- Первая – с ноября.
- Вторая – через 1-3 месяца после первой вакцинации.
- Третья – через 9-12 месяцев после второй вакцинации.



РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР
ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ
УДМУРТОВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ



ЗД^{СИГ}РОВАЯ
УДМУРТИЯ



8 800 200 0 200
TAKZDOROVO.RU



Предупредительные меры (неспецифическая профилактика)

На прогулку в лес, поле, парк, сквер:

- Надевайте однотонную светлую одежду, чтобы лучше видеть клещей.
- Заправляйте брюки в сапоги, а рубашку – в брюки. Манжеты рукавов должны плотно облегать запястья. Плечи и шея должны быть закрыты.
- Прячьте волосы под головной убор.
- Используйте репелленты. На упаковке репеллента должна быть маркировка, подтверждающая эффективность против клещей.



РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР
ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ



ЗД^ОРОВАЯ
УДМУРТИЯ



8 800 200 0 200
TAKZDOROVO.RU



Предупредительные меры (неспецифическая профилактика)

После прогулки:

- Проводите самоосмотры и взаимоосмотры.
- Тщательно вытряхивайте одежду, а затем стирайте в горячей воде.
- Осматривайте домашних животных.
- Не приносите домой дачные или лесные цветочные букеты, веники и травы.

Кипятите молоко коз и коров перед употреблением.

**Правильные действия по предотвращению
укуса клеща, а также своевременная
вакцинация помогут защитить Ваше здоровье!**



РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР
ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ



ЗД^{СИГНАЛ}РОВАЯ
УДМУРТИЯ



8 800 200 0 200
TAKZDOROVO.RU

