



Официальный портал
Минздрава России
об онкологических заболеваниях



ПИГМЕНТНЫЕ РОДИНКИ



ПИГМЕНТНЫЕ РОДИНКИ ВОЗНИКАЮТ ИЗ-ЗА ПЕРЕИЗБЫТКА В КЛЕТКАХ МЕЛАНИНА.

ОНИ РАЗВИВАЮТСЯ В ТЕЧЕНИЕ 5 – 10 ЛЕТ, ХОТЯ ИЗВЕСТНЫ СЛУЧАИ ПОЯВЛЕНИЯ В БОЛЕЕ ПОЗДНЕМ ВОЗРАСТЕ.

ВНЕШНЕ НЕВУСЫ ВЫГЛЯДЯТ КАК ПЯТНА ИЛИ ОБРАЗОВАНИЯ ПОВЫШЕННОЙ ПЛОТНОСТИ РАЗЛИЧНОЙ ВЕЛИЧИНЫ, ФОРМЫ, ЦВЕТА.

КОНСИСТЕНЦИЯ НЕ ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ЗДОРОВОЙ КОЖИ ИЛИ НЕЗНАЧИТЕЛЬНО УПЛОТНЕНА.

СОСУДИСТЫЕ РОДИНКИ



СОСУДИСТЫЕ РОДИНКИ ПОЯВЛЯЮТСЯ ИЗ-ЗА АКТИВНОГО РАЗМНОЖЕНИЯ КЛЕТОК ЭНДОТЕЛИЯ – ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ СТЕНОК СОСУДОВ.

ОНИ ПРОЯВЛЯЮТСЯ В ВИДЕ ИЗМЕНЕНИЯ СОСУДИСТОЙ СТРУКТУРЫ КОЖИ.

ТАКИЕ НЕВУСЫ НАЗЫВАЮТ АНГИОМАТОЗНЫМИ.


БОРОДАВЧАТЫЙ НЕВУС



ВЫПУКЛЫЕ РОДИНКИ БУРОГО ИЛИ
КОРИЧНЕВОГО ЦВЕТА,
НАПОМИНАЮЩИМИ ВНЕШНЕ ЦВЕТНУЮ
КАПУСТУ.

НЕВУСЫ БЫВАЮТ РАЗНОГО ЦВЕТА –
СЕРЫЕ, КОРИЧНЕВЫЕ, ГОЛУБЫЕ, ЧЕРНЫЕ.

ПЕРВИЧНАЯ САМОДИАГНОСТИКА РОДИНКИ – ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА ПЕРЕД СОБОЙ И СВОИМИ БЛИЗКИМИ



СПЕЦИАЛИСТЫ РЕКОМЕНДУЮТ

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ ДИАГНОСТИКУ РОДИНОК СПЕЦИАЛИСТЫ РЕКОМЕНДУЮТ ПРОВОДИТЬ ДО 10 РАЗ В ГОД.

В ОСНОВНОМ ИЗМЕНЕНИЯ В СОСТОЯНИИ И РОСТЕ РОДИНОК МОГУТ ПРОИСХОДИТЬ ЛЕТОМ, КОГДА ВОЗДЕЙСТВИЕ СОЛНЕЧНЫХ ЛУЧЕЙ НАИБОЛЕЕ АКТИВНО, И ПОСЛЕ НЕГО.



ФАКТОРЫ, СВИДЕТЕЛЬСТВУЮЩИЕ О ЗЛОКАЧЕСТВЕННОМ ПЕРЕРОЖДЕНИИ РОДИНОК:

- СТРЕМИТЕЛЬНЫЙ РОСТ РОДИНОК;
- ИЗМЕНЕНИЯ ЦВЕТА, ПОВЕРХНОСТИ, ФОРМЫ ОБРАЗОВАНИЯ;
- ПОЯВЛЕНИЕ ЗУДА;
- БОЛЬ В ОБЛАСТИ РОДИНКИ;
- ОБРАЗОВАНИЕ НАЧИНАЕТ МОКНУТЬ ЛИБО ПЕРИОДИЧЕСКИ КРОВОТОЧИТ.

ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ЛЮБЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ПО ОДНОМУ ИЗ ПАРАМЕТРОВ, НЕОБХОДИМО НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО ОБРАЩАТЬСЯ К ВРАЧУ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ПРИЧИНЫ.